

အရေးကြီးသော
ကျန်းမာရေး
သတိပြုရန်အချက်



ဤလူနာသည် လူတစ်ဦးနေစဉ် ပျမ်းမျှလိုအပ်သော
ကော်တီဇိုင်းဆေးပမာဏကို ကြာရှည်စွာသောက်သုံးနေပါသည်။
ရောဂါဗီဇဆိုင်ရာများသောအချိန် - ပြင်းထန်စွာနာမကျန်းခြင်း၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဖျိုအန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝမ်းလျှောခြင်းအခြေအနေတွင်

Hydrocortisone

- အသက် : ၁ နှစ်အောက် : 25 mg
- အသက် : ၁ နှစ်မှ ၆ နှစ် : 50 mg
- အသက် : ၆ နှစ်အထက် : 100 mg

ကို သွေးကြောဆေးသွင်းခြင်း / အသားဆေးထိုးခြင်းနှင့်

0.9% Saline ဆေးသွင်းခြင်းကို

နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

အမည်

လူနာအမှတ်စဉ်နံပါတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်

မြန်မာနိုင်ငံဟော်မုန်းရောဂါအထူးကုဆေးပညာအဖွဲ့